

PRACTICA 4b

Aproximación discreta de mínimos cuadrados.

Aproximación discreta por mínimos cuadrados. En general, los problemas que aparecen en la ciencia nos enfrentan a la observación de cantidades que cambian en el tiempo y/o el espacio. Supongamos que este cambio puede ser modelado por una relación matemática $y(x) = f(c_1, \dots, c_n; x)$ donde x es el parámetro que describe el cambio y c_1, \dots, c_n son n cantidades desconocidas, llamadas *parámetros del modelo*, cuyos valores queremos determinar. En particular consideremos el caso en que el modelo es *lineal* en sus parámetros, esto es, la relación funcional f es lineal respecto de los parámetros c_1, \dots, c_n y por lo tanto puede expresarse como

$$f(c_1, \dots, c_n; x) = \sum_{j=1}^n c_j \phi_j(x)$$

para n funciones $\phi_j(x)$ del parámetro x . Un conjunto de m observaciones de f proveerá de valores medidos y_i afectados de errores ϵ_i

$$\begin{aligned} y_i &= y(x_i) + \epsilon_i \\ &= \sum_{j=1}^n \phi_j(x_i) c_j + \epsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, m. \end{aligned}$$

Definiendo la *matriz de diseño*, $m \times n$, A de elementos $a_{ij} = \phi_j(x_i)$, el *vector de parámetros*, $n \times 1$, \mathbf{x} de elementos c_i , el *vector de medidas*, $m \times 1$, \mathbf{b} de elementos y_i , el *vector de residuos*, $m \times 1$, \mathbf{r} de elementos ϵ_i , el conjunto de ecuaciones anteriores puede escribirse matricialmente como

$$A\mathbf{x} + \mathbf{r} = \mathbf{b}.$$

Esta relación constituye nuestro modelo lineal de las observaciones. Si $m \geq n$ (más observaciones que parámetros) se trata ahora determinar el conjunto de parámetros \mathbf{x} que satisfaga mejor, en algún sentido, el modelo lineal. De acuerdo al *método de mínimos cuadrados*, los estimadores de mínimos cuadrados de los parámetros son aquellos valores que minimizan la norma euclídea de los residuos

$$\|\mathbf{r}\|_2 = \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|_2 = (\mathbf{r}^t \mathbf{r})^{1/2}$$

Este requisito conduce a que la solución de mínimos cuadrados debe satisfacer las *ecuaciones normales*

$$(A^t A)\mathbf{x} = A^t \mathbf{b},$$

de donde se sigue que, cuando $A^t A$ es no-singular, la solución de mínimos cuadrados existe y es única. La condición *necesaria y suficiente* para la existencia de una solución única es que las columnas de la matriz

A sean linealmente independientes o, dicho en forma equivalente, que el rango de la matriz A sea n . En tal caso, es fácil ver que la matriz $A^t A$ es simétrica y definida positiva¹, con lo cual un método numérico apropiado para resolver las ecuaciones normales es el *método de Choleski*. Sin embargo, en la práctica, muy a menudo las columnas de A son aproximadamente linealmente dependientes lo cual conduce a un sistema de ecuaciones normales con una matriz mal condicionada. Por tal motivo resulta fundamental recurrir a otra forma de resolución numérica del problema. En particular el *método QR* evita la formación de las ecuaciones normales y garantizan la estabilidad de la solución frente a los errores de redondeo. Este método se basa en la existencia de la factorización QR de la matriz A $m \times n$, cuando la misma es de rango n ,

$$A = QR,$$

siendo Q es una matriz $m \times n$ cuyas columnas son una base ortonormal del espacio columna de A (con lo cual $Q^t Q = I_n$) y R es una matriz cuadrada de orden n triangular superior con elementos positivos sobre la diagonal. En tal caso las ecuaciones normales toman la forma

$$(QR)^t(QR)\mathbf{x} = (QR)^t \mathbf{b},$$

es decir

$$R^t R \mathbf{x} = R^t Q^t \mathbf{b}$$

y como R es no-singular, se obtiene $R\mathbf{x} = Q^t \mathbf{b}$. Así, conocida la factorización QR de A , la solución de mínimos cuadrados resulta, pues, por sustitución hacia atrás del sistema triangular superior

$$R\mathbf{x} = \hat{\mathbf{b}}, \quad \hat{\mathbf{b}} = Q^t \mathbf{b}.$$

La subrutina LA_GELS de la biblioteca de rutinas Lapack95 efectúa este procedimiento para resolver el problema de mínimos cuadrados.

La teoría anterior puede ser aplicada en particular al caso en que la relación funcional del modelo lineal sea un polinomio de grado a lo más $(n-1)$:

$$f(c_1, \dots, c_n; x) = \sum_{j=1}^n c_j x^{j-1} = c_1 + c_2 x + \dots + c_n x^{n-1}.$$

En este caso la matriz A tiene elementos $a_{ij} = x_i^{j-1}$. Los estimadores de mínimos cuadrados conducen así al *ajuste de los datos observacionales por un polinomio de mínimos cuadrados*.

Ejercicio 1. Mostrar que la recta $y = c_1 + c_2 x$ que ajusta por mínimos cuadrados (llamada *recta de regresión*) un conjunto de m datos (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, m$,

¹Esto es, $\mathbf{x}^t A \mathbf{x} > 0$ para todo $\mathbf{x} \neq 0$.

tiene por coeficientes

$$c_1 = \frac{\sum_{i=1}^m x_i^2 \sum_{i=1}^m y_i - \sum_{i=1}^m x_i y_i \sum_{i=1}^m x_i}{m \sum_{i=1}^m x_i^2 - (\sum_{i=1}^m x_i)^2},$$

$$c_2 = \frac{m \sum_{i=1}^m x_i y_i - \sum_{i=1}^m x_i \sum_{i=1}^m y_i}{m \sum_{i=1}^m x_i^2 - (\sum_{i=1}^m x_i)^2}.$$

Ejercicio 2. Escribir un programa Fortran que calcule los coeficientes del polinomio de mínimos cuadrados de grado g que ajusta a un conjunto dado de datos (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, m$ ($m \geq n = g + 1$). *Indicación:* Construya la matriz de diseño del problema y utilice la subrutina `LA_GELS` de Lapack95 para resolver el problema de mínimos cuadrados correspondiente.

Ejercicio 3. Determine los posibles polinomios de mínimos cuadrados de distintos órdenes para el siguiente conjunto de datos. En base a sus resultados, ¿puede decidir cual es el polinomio apropiado para representar el comportamiento de los datos experimentales?

i	x_i	y_i
1	-0.9	81.0
2	-0.7	50.0
3	-0.5	35.0
4	-0.3	27.0
5	-0.1	26.0
6	0.1	60.0
7	0.3	106.0
8	0.5	189.0
9	0.7	318.0
10	0.9	520.0

Ejercicio 4. El nivel de agua del Mar del Norte está determinado fundamentalmente por la denominada marea M_2 cuyo período es de alrededor de 12 horas y su expresión aproximada es

$$H(t) = h_0 + a_1 \sin \frac{2\pi t}{12} + a_2 \cos \frac{2\pi t}{12}$$

con t medido en horas. Hallar la expresión que ajusta por mínimos cuadrados las siguientes mediciones.

i	1	2	3	4	5	6
t_i	0	2	4	6	8	10
H_i	1.0	1.6	1.4	0.6	0.2	0.8

Mostrar que en este caso particular al formar las ecuaciones normales $A^t A$ es una matriz diagonal.

Ejercicio 5. Considere un ajuste de la forma $y = b e^{ax}$ para el conjunto de medidas dada en la siguiente tabla.

x	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
y	5.10	5.79	6.53	7.45	8.46

Se quiere determinar los coeficientes a y b que mejor ajusten a los datos.

a) Explique porqué no puede aplicar directamente el método de mínimos cuadrados al ajuste propuesto.

b) Considerando el logaritmo de la ecuación propuesta, determine los coeficientes a y b a partir de la recta de mínimos cuadrados que ajusta al logaritmo de las medidas.

c) Utilice la rutina `fit` del programa `gnuplot` para determinar el modelo no lineal original del problema. Compare el resultado con el obtenido en el punto anterior.